

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
министра здравоохранения
Красноярского края

«_____» _____ 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГБУЗ «Красноярской
краевой офтальмологической
клинической больницы»

_____ С.С. Ильенков

«_____» _____ 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В КГБУЗ КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА НА 2016 год

№	МНН	Торговое наименование (может изменяться по результатам закупок)	Форма выпуска	Категор. (ГГ/ФК)	Примечания
1.	Анестетики				
1.1.	Средства для наркоза				
	Галотан	Фторотан	Фл. 50мл	ГГ	
	Кетамин	Калипсол	Амп. 5 % 2 мл	ГГ	Противопоказан при эпилепсии, особенно у детей
	Пропофол	Диприван, Рекофол	Эмульс. 10мг/мл 20мл	ГГ	С осторожностью при эпилепсии, дети до 3х лет
	Севофлуран	Севоран	Фл. 100мл	ГГ	Для ингаляционного наркоза в детской практике
	Тиопентал натрия	Тиопентал натрия	Фл. 1,0 пор.	ГГ	
1.2.	Местные анестетики				
	Артикаин+эпинефрин	Ультракаин ДС	Амп 2 мл	ГГ	Побочный эффект-«помутнение» в глазах как следствие сосудистого спазма
	Бупивакаин	Маркаин, анекаин	Фл. 0,5% 20 мл	ГГ	Токсический эффект в виде нарушения зрения (метаморфопсии, снижение зрения)
	Оксибупрокаин	Инокаин	Гл. кап. фл. 0,4% 5 мл	ГГ	Противопоказан при эрозиях роговицы
	Прокаин	Новокаин	Амп. 2% 2мл, Амп. 0,5% 2мл, Фл. 2% 100мл, Фл. 1% 200мл	ГГ	Антихолинэстеразные средства повышают токсичность прокаина, тормозя его гидролиз.
	Проксиметакаин	Алкаин	Гл. кап. фл 0,5%. 15 мл	ФК	Противопоказан при эрозиях роговицы
	Лидокаин	Лидокаин	Амп. 2% и 10% 2мл Гл. кап. 2% 1,5мл Аэроз. флак. 10% 50мл	ГГ	
	Ропивакаин	Наропин	Амп. 0,75% 10мл	ГГ	С осторожностью назначают больным с блокадами сердца, циррозом печени, почечной недостаточностью
2.	Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства				
	Неостигмина метилсульфат	Прозерин	Амп. 0,05% 1мл	ГГ	Побочный эффект-расстройства аккомодации глаз. Приводит к интоксикации у резко ослабленных детей
	Суксаметония хлорид	Листенон, дитилин	Амп. 0,1/ 5мл	ГГ	Противопоказан детям до 1 года
3.	Анальгетики, НПВС				
3.1.	Наркотические анальгетики				
	Грамадол	Трамал	Амп. 0,05/мл Амп. 0,1/2мл	ГГ	Противопоказан детям до 14 лет
	Тримеперидин	Промедол	Амп. 2% 1мл	ГГ	С осторожностью детям до 18 лет

	Фентанил	Фентанил	Амп. 0,005% 2 мл	ГГ	
3.2.	Ненаркотические анальгетики и НПВС				
	Ацетилсалициловая кислота	Аспирин	Таб. 500мг	ГГ	Противопоказан при геморрагическом диатезе, эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ. Противопоказан детям до 15 лет
	Парацетамол	Перфалган	Р-р для инфузий фл. 50мл	ГГ	Противопоказан детям до 1 месяца, с осторожностью детям до 3 месяцев
		Парацетамол Цефекон	Сироп 2,4% 100мл Супп.0,1	ГГ ГГ	
	Диклофенак	Диклофенак Наклоф, дикло-Ф	Амп. 75мг/3мл глаз.кап.Фл. 0,1% 5 мл	ГГ ФК	Противопоказан при нарушениях свертывания крови, язвенной болезни желудка и ДПК в фазе обострения. Противопоказан детям до 3 месяцев, с осторожностью детям до 12 лет
	Ибупрофен	Ибупрофен Нурофен	Таб.п/о 200мг Сусп.100 мл	ГГ ГГ	
	Кеторолак	Кетанов, кеторол	Амп. 0,03/мл	ГГ	
	Лорноксикам	Ксефокам	Фл. 4мг Таб.8мг	ГГ	Противопоказан при нарушениях свертывания крови, язвенной болезни желудка и ДПК в фазе обострения. Противопоказан детям до 3 месяцев, с осторожностью до 12 лет
	Метамизол натрия	Анальгин	Амп. 50% 1мл	ГГ	Разрешен с 3 месяцев
	Метамизол+питофенон+ фенпивериния бромид	Спазмалгин, ревалгин	Амп. 5мл Таб.0,5+5мг+0,1мг	ГГ	Разрешен с 3 месяцев
4.	Средства для лечения аллергических заболеваний				
	Дифенгидрамид	Димедрол	Амп. 1% 1мл,фл.1% 100мл	ГГ	Противопоказан при эпилепсии, детям до 7 месяцев
	Клемастин	Тавегил	Таб. 0,001 Амп. 1мг/мл 2мл	ГГ	Противопоказан детям до 1 года, с осторожностью детям до 6 лет
	Лоратадин	Клоратадин	Таб.10мг Сироп фл. 5мг/5мл,100мл	ГГ	С осторожностью детям до 3 лет
	Олопатадина гидрохлорид	Опатанол	Фл. 0,1% 5мл	ФК	
	Хлоропирамин	Супрастин	Амп. 20мг/мл 1мл	ГГ	Противопоказан детям до 1 месяца
5.	Средства, влияющие на ЦНС				
5.3.	Анксиолитики (транквилизаторы)				
	Бромдегидрохлорфенилбензодиазепин	Феназепам	Таб. 0,5мг	ГГ	С осторожностью назначают при заболеваниях органов дыхания, тяжелых заболеваниях печени и почках, у пожилых применяют в меньших дозах

	Диазепам	Седуксен, сибазон, реланиум	Таб.2мг Амп. 10мг 2мл	ГГ	Противопоказан при остром приступе глаукомы. Противопоказан детям до 1 месяца
	Диазепам+ циклобарбитал	Реладорм	Таб.5мг	ФК	Противопоказан при остром приступе глаукомы
	Мидазолам	Дормикум, фулсед	Амп. 5мг/1мл 3мл	ГГ	С осторожностью в детском возрасте до 6 лет
5.4.	Антипсихотические препараты				
	Хлорпромазин	Аминазин	Фл. 2,5% 1мл	ГГ	Побочный эффект-диплопия. Противопоказан детям до 6 месяцев. С осторожностью при хронических заболеваниях, сопровождающихся нарушением дыхания у детей; при синдроме Рейе в анамнезе.
	Дроперидол	Дроперидол	Фл. 0,25% 5мл	ГГ	Побочный эффект-диплопия. Противопоказан детям до 2х лет
5.8.	Прочие лекарственные средства, влияющие на ЦНС				
	Кофеин бензоат натрия	Кофеин	Амп. 20% 2мл	ФК	Не рекомендуется использовать при гипотонии
	Никетамид	Кордиамин	Амп. 25% 1мл Фл.30мл	ФК	
	Винпоцетин	Кавинтон	Амп. 0,5% 2мл	ГГ	
	Даларгин	Даларгин	Амп. 0,001/2мл	ФК	
	Церебролизин	Церебролизин	Амп. 1мл, 5мл	ГГ	
	Ново-пассит	Ново-пассит	Фл.100,0 мл	ФК	
	Пирацетам	Ноотропил	Амп. 20% 5мл	ГГ	
	Флумазенил	Анексат	Амп. 0,1/мл 5мл	ГГ	
6.	Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций				
6.1.	Антибактериальные средства				
	Амоксициллин	Флемоксин салютаб	Таб. п/о 0,5	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. группа пенициллинового ряда)
	Ванкомицин	Ванкомицин	Фл.1,0	ГГ	Избегать использования при беременности, кормлении грудью, с осторожностью –в пожилом возрасте
	Имепенем+Циластатин	Тиенам	Фл. 0,5 и 1,0	ГГ	
	Меропенем	Меронем	Фл. 1,0	ГГ	
	Левифлоксацин	Офтаквикс	Глаз.кап. Фл. 0,5% 5мл	ФК	Противопоказан детям до 14 лет, а также при беременности и кормлении грудью
	Нитрофуран	Фурацилин	Фл.1:1500	ГГ	Разрешен детям с 1 месяца
	Моксифлоксацин	Вигамокс	Глаз.кап. Фл. 0,5% 5мл	ФК	Разрешен детям с 1 года

	Норфлоксацин	Нормакс Норбактин	Глаз.кап.Фл. 0,3% 5мл Таб.п/о 400мг	ГГ	Таблетированная форма: Со стороны пищеварительной системы: анорексия, горечь во рту, тошнота, рвота, абдоминальные боли, диарея, псевдомембранозный энтероколит (при длительном применении), повышение активности печеночных трансаминаз. Со стороны мочевыделительной системы: кристаллурия, гломерулонефрит, дизурия, полиурия, альбуминурия, уретральные кровотечения, гиперкреатининемия. Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница, галлюцинации. Аллергические реакции: кожный зуд, крапивница, отеки, синдром Стивенса-Джонсона.
	Офлоксацин	Флоксал	Глаз.кап.Фл 0,3% 5мл , глазн.мазь 0,3% туба 3,0	ФК	Противопоказан детям до 14 лет, а также при беременности и кормлении грудью
	Сульфациламид	Сульфацил-натрия	Глаз.кап. Фл. 10%, 20% 5мл	ГГ	
	Тобрамицин	Тобрекс, тобропт	Глаз.кап. Фл 0,3% 5мл Мазь глаз. 0,3% 10,0 туба	ФК	С осторожностью в детском возрасте до 2 лет
	Цефазолин	Кефзол, нацеф	Фл. 1,0	ГГ	Противопоказан детям до 1 месяца, с осторожностью детям до 1 года
	Цефепим	Максипим	Фл.1,0	ГГ	
	Цефотаксим	Клафоран, цефабол	Фл. 1,0	ГГ	Противопоказан детям до 2,5 лет в/м
	Цефтриаксон	Цефсон	Фл. 1,0 с растворителем	ГГ	
	Цефуросим	Цефурабол, зинацеф	Фл. 1,5	ГГ	
	Ципрофлоксацин	Цифран, ципролет	Глаз.кап. Фл. 0,3% 5мл Таб.250мг	ФК ГГ	Противопоказан при беременности. Детский возраст до 1 года (для глазных капель)
6.2.	Противотуберкулезные средства				
	Стрептомицин	Стрептомицин	Фл.1,0	ГГ	Нежелательные реакции- неврит или атрофия зрительного нерва
6.3.	Противовирусные средства				
	Ацикловир	Виролекс, зовиракс	Глазн.мазь 3% туба 4,5 Таб.200мг,400мг Фл. 250мг	ГГ ГГ ГГ	Детский возраст до 3 лет (для твердых лекарственных форм)
	Дифенгидрамин+ИНФ альфа2человеч.рекомбин.	Офтальмоферон	Глаз.кап.Фл. 10мл	ФК	Возрастные ограничения отсутствуют
		Панавир	Амп. 0,004% 5мл	ФК	Противопоказан больным с тяжелой патологией почек и селезенки, в период лактации, детям до 18 лет.

	Интерферон альфа 2b	Реаферон, Лайферон Интерферон лейкоц.человеч.сухой	Порош.лиоф. д/кап.глазн. Фл.1 млн. МЕ/мл Амп.1тыс МЕ/мл	ГГ ФК	С осторожностью детям до 14 лет. Противопоказан беременным
	Полиадениловая+ уридилловая к-та	Полудан	Фл. Пор.д/кап.глаз.100ЕД	ФК	Введение Полудана в переднюю камеру глаза противопоказано при кератоиридоциклитах с изъязвлением передней поверхности роговицы, конъюнктивите. В т.ч.гиперчувствительность, беременность, кормление грудью, возраст до 14 лет.
	Ганцикловир	Зирган	Гель глазной 0,15%, туба 5,0	ФК	Со стороны органа зрения: - очень часто (> 1/10) - преходящее чувство жжения или покалывания в глазу; - часто (> 1/100, <1/10) - поверхностный крапчатый кератит. Не рекомендуется применять в период беременности или кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять детям.
6.7.	Прочие средства для профилактики и лечения инфекций				
	Бифидобактерии бифидум	Бифидумбактерин	Капс., 5 доз	ГГ	
6.10	Сыворотки				
	Противостолбнячная сыворотка	Противостолбнячная сыворотка	Амп. 3000МЕ	ГГ	
9.	Средства, влияющие на кровь				
9.1.	Противоанемические средства				
	Цианокобаламин	Витамин В12	Амп. 500мкг 1мл	ГГ	
9.2.	Средства, влияющие на систему свертывания крови				
	Аминокапроновая кислота	Аминокапроновая кислота	Фл 5% 100мл.	ГГ	Противопоказан при склонности к тромбозам. Клапанные пороки сердца у детей любого возраста
	Надропарин кальция	Фраксипарин	Амп. 2850 МЕ/0,3мл шприц.	ГГ	С осторожностью –пожилой возраст, беременность
	Стрептокиназа	Стрептокиназа	Порош.лиоф. д/приг.р-ра Фл.250 тыс.ЕД	ГГ	
	Гепарин натрий	Гепарин	Амп. 5мл 5000 ЕД/мл	ГГ	
	Этамзилат	Дицинон, этамзилат	Амп. 12,5% 2мл	ГГ	Противопоказан при склонности к тромбозам
9.3	Растворы и плазмозаменители				
	Гидроксиэтилкрахмал	Рефортан, инфукол ГЭК, Реохез	Флак. 6% 250мл	ГГ	Противопоказан при тяжелой сердечной, почечной недостаточности
	Декстран	Полиглюкин, реополиглюкин	Глаз.кап.фл.10мл Флак 200мл	ФК ГГ	

	Декстроза	Глюкоза	Флак.5% 100, 200мл Амп.40% 10мл Глаз.кап. фл. 20% 5мл	ГГ ГГ ФК	С осторожностью при сахарном диабете
10.	Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему				
	Азаметония бромид	Пентамин	Амп. 5% 1 мл	ГГ	Противопоказан при ЗУГ, побочный эффект-мигриаз
	Амиодарон	Амиокордин, Кардиодарон, кордарон	Таб.200мг Амп. 0,05/мл 3мл	ГГ	Нарушения зрения из-за образования отложений на роговице (обратимое)
	Атропина сульфат	Атропин	Глаз.кап. Фл.1% 5 мл Амп. 0,1% 1мл	ФК ГГ	Противопоказан при глаукоме. Побочные эффекты при местном применении-повышение ВГД, гиперемия, отек конъюнктивы
	Допамин	Дофамин	Амп. 0,5% 5мл	ГГ	
	Изосорбида динитрат	Изокет, кардикет	Аэр.доз. 1,25мг/доза бал. 300доз, таб. 40мг Амп. 0,1% 1мл	ГГ	
	Индапамид	Индапамид	Таб.п/о 2,5мг	ГГ	Побочные эффекты-обратимая острая миопия
	Каптоприл	Капотен	Таб.25мг	ГГ	
	Ксилометазолин	Галазолин	Капли в нос, фл. 0,05%; 0,1% 10мл	ФК	Показания-Детский возраст до 6 лет- 0,1 % раствора, детский возраст до 2х лет - 0,05% раствора
	Метопролол	Метопролол-акри, эгилок	Таб. п/о 50мг	ГГ	
	Нитроглицерин	Нитроглицерин	Таб. субл.0,5мг	ГГ	
	Нифедипин	Коринфар кордафлекс	Таб. п/о 10мг Таб.20мг	ГГ	Побочные эффекты-боль в глазах, нарушения зрения
	Пропранолол	Обзидан	Амп. 0,005/5мл	ГГ	Побочные эффекты-обратимая ксерофтальмия
	Бендазол	Дибазол	Амп. 1% 2мл, фл. 0,015% 10мл	ФК	Противопоказан детям до 1 года
	Триметилгидразиния пропионат	Милдронат, кардионат	Амп. 0,5/5мл	ФК	
	Фенилэфрин	Мезатон, ирифрин	Амп. 1% 1мл Фл. 2,5%и 10% 5мл	ГГ ФК	Побочные эффекты при местном применении боль и покалывание в глазах, затуманивание зрения, фотофобия. С осторожностью детям до 18 лет
	Эналаприл	Эналаприл-акри, ренитек Эналаприлат	Таб. 5мг,10мг,2мг Амп. 1,25/мл	ГГ	Побочные эффекты-обратимое нарушение зрения
	Урапидил	Эбрантил	Амп. 25мг/5мл	ФК	Противопоказан при аортальном стенозе, открытом Баталовом протоке, гипотонии, беременности
	Эпинефрин	Адреналина гидрохлорид	Амп. 0,1% 1мл	ГГ	Противопоказан при ЗУГ

11	Диагностические средства				
11.1	Рентгеноконтрастные средства				
	Амидотризоат натрия и меглумина	Урографин	Амп. 76% 20мл	ФК	Тошнота, рвота, головокружение, цианоз, чувство жара, лихорадка, потоотделение, рвота
	Флюоресцеин натрия	Флюоресцит	Амп. 100мг/мл 5мл	ФК	Кожная сыпь, головокружение, тошнота, окрашивание кожи и мочи в желтый цвет
12.	Антисептики и средства дезинфекции				
12.1.	Антисептики				
	Хлорамфеникол 7,5мг+метилурацил 40мг	Левомеколь	Глаз.мазь туба 40,0	ФК	
	Аммиак		Фл.10% 40мл	ГГ	
		Протаргол	Капли в нос Фл.1% 5мл	ФК	Возрастные ограничения отсутствуют
		Колларгол	Глаз.кап.фл.3% 10мл	ФК	Возрастные ограничения отсутствуют
	Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой бриллиантового зеленого	Фл.1% 25 мл	ГГ	
	Йод	Спиртовой раствор йода	Фл. 5% 25 мл	ГГ	Противопоказан детям до 5 лет
	Клиндезин-элит+	Клиндезин-элит+	Фл.1 литр	ФК	
	Миродез мусс	Миродез мусс	Фл.1 литр	ФК	
	Пиклоксидин	Витабакт	Глаз.кап.фл. 0,05% 10мл	ФК	
	Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний	Окомистин	Глаз.кап.фл. 0,01% 10мл	ФК	Допустим к использованию на протяжении периода беременности. Данные касательно отрицательного влияния на протяжении периода кормления грудью отсутствуют. Может применяться у детей.
	Этанол	Спирт этиловый	Фл. 70% 100мл, кг	ГГ	
12.2.	Средства для дезинфекции				
	Лакто	Лакто	Фл.1 литр	ФК	
	Централь	Централь	Фл.1 литр	ФК	
	Вирбаксан	Вирбаксан	Фл.1 литр	ФК	
	Ника-амицид	Ника-амицид	Фл.1 литр	ФК	
	Авансепт-спрей	Авансепт-спрей	Фл.0,5 литр	ФК	
	Сальваниос рН7	Сальваниос рН7	Фл.1 литр	ФК	
	Сайдекс	Сайдекс	Канистра 5 л	ФК	
	Экобриз окси	Экобриз окси	Фл.1 литр	ФК	
	Энзимодез	Энзимодез	Фл.1 литр	ФК	
	Ника-экстра М	Ника-экстра М	Фл.1 литр	ФК	

	Хлормисепт-Р	Хлормисепт-Р	таб. №300, гранулы 1 кг	ФК	
	Аква хлор	Аква хлор	таб. №315	ФК	
	Жидкое мыло антибактериальное «Ника-свежесть»	Жидкое мыло антибактериальное «Ника-свежесть»	Фл.1 литр	ФК	
13.	Средства для лечения заболеваний ЖКТ				
13.1.	<i>Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в ЖКТ</i>				
	Метоклопрамид	Церукал	Таб. 10мг Амп. 0,01/2мл	ГГ	Противопоказан при глаукоме. С осторожностью в раннем детском возрасте (повышенный риск возникновения дискинетического синдрома)
	Фамотидин	Фамотидин	Таб.п/о 0,02	ГГ	
	Омепразол	Омепразол, лосек	Капс. 20мг	ГГ	Побочные эффекты-диарея,рвота,головная боль,крапивница,бронхоспазм,периферические отеки
13.2.	<i>Спазмолитические средства</i>				
	Дротаверин	Но-шпа, дротаверин	Таб. 40мг Амп. 2% 2мл	ГГ	
	Платифиллин	Платифиллин	Амп. 0,2% 1мл	ГГ	
13.3.	<i>Панкреатические энзимы</i>				
	Панкреатин	Панкреатин, мезим-форте	Таб.п/о 250мг	ГГ	При применении больших доз-раздражение слизистой оболочки,тошнота,рвота, дискомфорт в эпигастрии
13.4.	<i>Антидиарейные средства</i>				
	Лоперамид	Лоперамид-акри	Капс. 2мг	ГГ	Не следует применять при беременности (особенно в I триместре) и кормлении грудью, при тяжелых нарушениях функции печени и в детском возрасте от 2 до 12 лет (возможно только при наличии врачебного контроля).
	Смектит диоктаэдрический	Смекта	Порош.3,0	ГГ	
13.5	<i>Слабительные средства</i>				
	Лактулоза	Дюфалак	Сироп фл. 200мл	ГГ	Боли в животе, метеоризм, диарея. Не рекомендуется использовать детям до 1 года.

13.7	Антиферменты				
	Апротинин	Гордокс, контрикал	Фл. 100тыс. КИЕ 10мл	ГГ	
14.	Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему				
14.1.	Неполовые гормоны, синтетические субстанции				
	Гидрокортизон	Гидрокортизон	Фл.сусп. 125мг/5мл. Мазь глаз.0,5% туба 3,0	ГГ ФК	Системное применение ГКС-вероятность возникновения стероидной катаракты. Местное применение противопоказано при вирусных и грибковых заболеваниях глаз, острых гнойных процессах, глаукоме.
	Дексаметазон	Дексаметазон, офтан-дексаметазон, максидекс	Сусп.глаз. фл. 0,1% Амп. 4мг/мл 1мл Глаз.кап.фл. 1мг/мл 5мл	ФК ГГ ФК	
	Бетаметазон	Дипроспан	Амп. сусп. 1мл	ГГ	
	Преднизолон	Преднизолон	Таб. 5 мг Амп. 0,025% 1мл Сусп. глаз. фл. 0,5% 10мл.	ГГ ГГ ФК	
	Триамцинолон	Кеналог	Амп. сусп. 10мг/мл 1мл	ГГ	
14.5.	Инсулин и средства для лечения сахарного диабета				
	Инсулин растворимый человеческий генноинженерный	Инсулин растворимый человеческий генноинженерный	Фл. 100ЕД/мл, 10мл	ГГ	
	Тиоктовая кислота	Берлитион	Амп. 25мг/мл 12мл	ГГ	
15	Средства, используемые в урологии				
15.3.	Диуретики				
	Ацетазоламид	Диакарб	Таб. 250мг	ГГ	Побочный эффект-обратимая миопия
	Фуросемид	Лазикс	Таб. 40мг амп. 20мг 2мл	ГГ	

16.	Средства для лечения офтальмологических заболеваний				
16.1.	Средства для терапии нарушений периферического кровообращения				
	Актовегин	Актовегин	Амп. 80мг/2мл гель глаз. 20% туба 5,0	ФК	
	Карбомер	Офтагель	Гель глаз. фл. 2,5мг/г 10мл	ФК	
	Солкосерил	Солкосерил	Амп. 2мл,гель глаз.20% туба 5,0	ФК	
16.2.	Мидриатики и циклоплегика				
	Тропикамид	Мидриацил	Глаз.кап.фл 0,5%, 1% 15мл	ФК	Побочные эффекты-парез аккомодации,фотофобия,повышениеВГД, приступ глаукомы С осторожностью в грудном возрасте
	Циклопентолат	Цикломед, Циклоптик	Глаз.кап.фл. 1% 5мл	ФК	Противопоказан при глаукоме. Побочные эффекты при местном применении-повышение ВГД,гиперемия, отек конъюнктивы. С осторожностью в детском возрасте
	Фенилэфрин5,0%+ тропикамид 0,8%	Мидримакс	Глаз.кап.фл. 5мл	ФК	Офтальмологические реакции: преходящее жжение, нечеткость зрительного восприятия, поверхностный точечный кератит, парез аккомодации, фотофобия, повышение внутриглазного давления, приступ глаукомы, аллергические реакции.Системные: сухость кожи и слизистых оболочек, в т.ч. сухость во рту, тошнота, рвота, тахикардия, бледность, возбуждение, головная боль, судороги, кома, паралич дыхания.При применении антихолинергических ЛС у детей сообщалось о развитии психотических реакций, поведенческих нарушений, вазомоторного или кардиореспираторного коллапса.
16.3.	Препараты для лечения глаукомы				

	Пилокарпина гидрохлорид	Пилокарпин	Глаз. кап.фл. 1% 5мл	ГГ	Противопоказан при иритах, иридоциклитах, предних увеитах. Побочные эффекты-миоз,спазм аккомодации, боль в области глаза, фолликулярный конъюнктивит. При передозировке возможна отслойка сетчатки.
	Бетаксолол	Бетоптик, Ксонеф, Бетофган	Глаз. кап фл. 0,25%,0,5% 5мл.	ФК	Противопоказан при брадикардии,блокадах сердца,СН,артериальной гипотензии,бронхоабструкции.
	Тимолол	Арутимол, офтан-тимолол	Глаз. кап фл. 0,25%, 0,5% 5мл	ГГ	Побочные метные эффекты-жжение,боль в глазу,гиперемия конъюнктивы,сухость в глазу,поражения роговицы. Противопоказан при дистрофии роговицы,сухом кератите. С осторожностью детям до 18 лет
	Пилокарпин 1%+ тимолол 0,5%	Фотил	Глаз. кап. фл.5мл	ФК	Противопоказан при СН,брадикардии, БА. Побочные метные эффекты-плоражения роговицы
	Травапрост 0,004%+ Тимолол 0,5%	Дуотрав	Глаз. кап. Фл 2,5мл.	ФК	ДуоТрав противопоказан детям до 18 лет, беременным и в период лактации
	Бринзоламид	Азопт	Глаз. кап.фл. 1% 5мл.	ФК	Побочные местные эффекты-жжение,зуд в глазах,конъюнктивит,передний увеит,преходящая миопия
	Дорзоламида гидрохлорид	Трусопт, Дорзопт	Глаз.кап.фл. 2% 5мл	ФК	
	Травопрост	Траватан	Глаз. кап.фл. 0,004% 2,5мл	ФК	
	Латанопрост	Ксалатан, глаупрост	Глаз.кап.фл. 0,005% 2,5мд	ФК	Побочные местные эффекты-усиление пигментации радужной оболочки,удлинение и увеличение густоты ресниц.Могут развиваться ирит,увеит,макулярный кистовидный отек
	Латанопрост 0,005%+ тимолол0,5%	Ксалаком	Глаз.кап.фл. 2,5мл	ФК	Системные побочные эффекты-ринит,коллапс,брадикардия,бронхоспазм, головная боль
	Дорзоламид 2%+ тимолол 0,5%	Косопт	Глаз.кап.фл. 5мл	ФК	Местные побочные эффекты-жжение, зуд,слезотечение, диплопия. Системные-ринит,коллапс,брадикардия,бронхоспазм, головная боль
	Бримонидин 0,2% + тимолол 0,5%	Комбиган	Глаз.капли фл.5мл.	ФК	Со стороны органов зрения: иридоциклит, миоз. Со стороны психики: бессонница. Со стороны органов дыхания: воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, одышка. Со стороны ЖКТ: изменение вкуса, диспепсия. Другие: системные аллергические реакции.
	Бринзоламид1% + тимолол 0,5%	Азарга	Глаз.капли фл.5мл.	ФК	Местные:ощущение инородного тела в глазу раздражение глаза, гиперемия, блефарит, конъюнктслезоточивость, зудснижение остроты зрения.раздражение глаза: гиперемия, слезоточивость, отекконъюнктивы, светобоязнь раздражение век: покраснение, дерматит, точечный кератит, пигментация роговицы, гифема, зрительный дискомфорт: снижение остроты зрения,затуманивание зрения, астинопия,сухость глаз

	Бримонидин 0,15%	Альфаган	Глаз.капли фл.5мл.	ФК	Со стороны органов зрения: очень часто — аллергический конъюнктивит, гиперемия конъюнктивы глаз, зуд слизистой оболочки глаз и кожи век; часто — ощущение жжения, фолликулез конъюнктивы глаз и фолликулярный конъюнктивит, местные аллергические реакции слизистой оболочки глаз (в том числе кератоконъюнктивит), блефарит, блефароконъюнктивит, нарушение четкости зрительного восприятия, катаракта, отек конъюнктивы, кровоизлияние в конъюнктиву, конъюнктивит, ретенционное слезотечение, слизистые выделения из глаз, сухость и раздражение слизистой оболочки глаз, боль, отек век, покраснение век, ощущение инородного тела в глазах, кератит, поражение век, фоточувствительность, поверхностная пятнистая кератопатия, слезотечение,
	Биматопрост 0,03% +тимолол 0,5%	Ганфорт	Глаз.кап.фл. 3мл		Со стороны ЦНС: редко - головная боль. Со стороны органа зрения: очень часто - гиперемия конъюнктивы, рост ресниц; часто - поверхностный кератит, эрозия роговицы, ощущение жжения, зуд, жгучая боль в глазах, ощущение инородного тела, сухость слизистой оболочки глаз, покраснение ресниц, боль в глазах, фотофобия, выделения из глаз, нарушения зрения, зуд кожи ресниц; нечасто - иридоциклит, раздражение слизистой глаз, отек конъюнктивы, блефарит, эпифора, отек ресниц, болезненность ресниц, снижение остроты зрения, астенопия, трихиаз; частота неизвестна: цистойдный макулярный отек. Со стороны органов дыхания: нечасто - ринит. Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: часто - пигментация кожи ресниц.
16.4.	Комбинированные противовоспалительные препараты				
	Дексаметазон+полимиксин+неомицин	Макситрол	Глаз. кап.фл. 5мл	ФК	Местное применение противопоказано при вирусных и грибковых заболеваниях глаз, острых гнойных процессах, осторожно использовать при глаукоме. С осторожностью детям до 3 месяцев
	Тобрамицин+дексаметазон	Тобрадекс, тобразон	Глаз.кап.фл.5мл	ФК	
	Дексаметазон+ципрофлоксацин	Комбинил-дуо	Глаз.кап. фл.5мл		
16.5.	Дедистрофические препараты				
	Гликозаминогликан	Баларпан	Глаз.кап. 0,01% Фл. 10мл	ФК	
	Декспантенол	Корнерегель	Глаз.гель 5% туба 5,0	ФК	

	Кортексин	Кортексин	Пор.лиоф.д/инъекц. Фл.010мг	ФК	Противопоказан при: индивидуальной непереносимости препарата. беременности.
	Ретиналамин	Ретиналамин	Пор. лиоф. д/инъекц. Фл.5мг	ФК	Противопоказан при: индивидуальной непереносимости, беременности
	Сулодексид	Вессел Дуэ Ф	Амп.600 ЛЕ 2мл	ФК	
	Таурин	Тауфон	Глаз.кап. Фл. 4% 10мл Амп. 4% 1мл	ФК	
16.6.	Ферменты				
	Коллагеназа	Коллалазин	Порош. д/приг. р-ов. Фл. 700КЕ	ФК	Возможно развитие различных аллергических реакций, а также образование язв роговицы.
	Гиалуронидаза	Лидаза	Порош.лиоф. д/инъекц. Амп.64 УЕ/5мл	ФК	В отдельных случаях возможно возникновение аллергических реакций, в месте инъекции возможны боль и инфильтраты. Очень редко при применении лекарственного средства может возникать фибрилляция желудочков.
	Фибринолизин	Фибринолизин	Порош.лиоф.Фл.20тыс ЕД	ФК	Противопоказания-Геморрагический диатез, кровотечения, открытые раны, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нефрит, гипофибриногенемия, туберкулез (острая форма), лучевая болезнь, повышенная чувствительность к фибринолизину.
		Экстракт алоэ	Амп. 1,0	ФК	
	Химотрипсин кристаллический	Химотрипсин	Флак. 5мг		Противопоказан при декомпенсации ССЗ, дыхательной недостаточности, поражениях почек, геморрагических диатезах.
	Проурокиназа	Гемаза	Порош. лиоф.д/приг. р-ра. Амп. 5000МЕ/2мл	ФК	При использовании препарата Гемаза по инструкции может отмечаться аллергическая реакция, выражающаяся в гиперемии и отеке кожных покровов лица, аллергический тенонит (гиперемия конъюнктивы, хемоз, уменьшение подвижности глазного яблока).
16.7.	Антиоксиданты				

	Метилэтилпиридиол	Эмоксипин	Амп. 1% 1,0 Глазн.кап.фл. 1% 5мл	ФК	При ретро- и парабульбарном введении возможны ощущение боли, жжения, зуд, покраснение, а также уплотнения параорбитальных тканей, рассасывающиеся самостоятельно.
16.8.	Препараты, применяемые во время операции				
	Азот жидкий	Азот жидкий	Баллон, л	ФК	
	Гидроксипропилметилцеллюлоза	Eye gel Plas	Шприц 2,4% 2мл	ФК	
	Вискоэластик на основе гиалуронатанатрия	Hiluron	Шприц 1мл 1,4%	ФК	
		Перфтордекалин	Фл.7мл	ФК	
		Akta-line-Perfluoro-octane	Фл.5мл	ФК	
	Масло силиконовое	Oxane 1300	Фл.10мл	ФК	
16.9.	Прочие офтальмологические средства				
	Ранибизумаб	Луцентис	Р-р д/инъекц.внутриглазн. 10мг/мл, фл.0,23мл (со шприц.,игл.)	ФК	Нежелательные явления со стороны глаз, наблюдавшиеся при применении препарата , включали интраокулярное воспаление и повышение ВГД.
18.	Средства, влияющие на органы дыхания				
18.1.	Противоастматические средства				
	Аминофиллин	Эуфиллин	Амп. 2,4% 5мл	ГГ	Противопоказан детям до 3 лет, с осторожностью детям до 18 лет.
	Сальбутамол	Сальбутамол	Аэр. 0,1мг/доза бал.12мл,100доз	ГГ	Детский возраст до 2х лет (для дозированного аэрозоля)
18.2	Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания				
	Амброксол	Лазолван	Таб 30мг, сироп 200мл.	ГГ	Противопоказания-Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, судорожный синдром различной этиологии, I триместр беременности, повышенная чувствительность к амброксолу.
19.	Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия				
	Вода дистилир., для инъекций	Вода дистилир., для инъекций	Флак. 150мл, 400мл; амп. 2мл	ФК	
	Калия хлорид	Калия хлорид	Амп. 4% 10мл	ГГ	Детям до 18 лет безопасность применения не установлена

	Кальция хлорид	Кальция хлорид	Амп. 10% 10мл фл. 2% 100мл.	ФК	
	Магния сульфат	Магния сульфат	Амп. 25% 10мл	ГГ	Признаки и симптомы гипермагниемии: брадикардия, диплопия, внезапный "прилив" крови к коже лица, головная боль, снижение артериального давления, тошнота, одышка. Использование у детей - из расчёта 1 г на 1 год жизни по строгим показаниям.
	Натрия ацетат тригидрат 2г+натрия хлорид 5г+калия хлорид 1г+вода д/инъекций до 1л	Ацесоль	Флак. 200мл	ФК	
	Натрия хлорид 6г+натрия уксусный 2г+вода д/инъекций до 1л	Дисоль	Флак.200мл	ФК	
	Натрия хлорид	Натрия хлорид	Фл. 0,9% 400мл, 200мл; Фл. 10% 200мл Амп. 0,9% 10мл	ГГ	
20.	Витамины				
	Аскорбиновая кислота	Витамин С	Амп. 5% 2мл, фл. 2% 200мл.	ГГ	
	Калия и магния аспарагинат	Панангин, аспаркам	Таб. Амп. 10мл	ГГ	
	Пиридоксина гидрохлорид	Витамин В6	Амп. 5% 1мл	ГГ	
	Рибофлавин моноклеотид	Витамин В2	Амп. 1% 1мл Глазн. кап. 0,02% 5мл	ФК	
	Тиамин	Витамин В1	Амп. 5% 1мл	ГГ	
21	Прочие средства				
	Водорода пероксид	Перекись водорода	Фл. 3% 200, 400мл; 6% 100, 400мл, 10л; 5% 1л.	ГГ	
		Никотиновая кислота	Амп. 1% 1мл, фл. 0,01% 50мл	ФК	Побочные действия при местном использовании в физиолечении-ощущение покалывания и жжения, прилива крови к голове, головокружение, гипотензия, гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения), детский возраст (до 2 лет — для назначения в качестве гиполипидемического средства).

	Пентоксифиллин	Трентал	Амп. 2% 5мл	ГГ	Детям до 18 лет безопасность применения не установлена
	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Мексидол	Амп. 5% 2мл	ГГ	

Зам. главного врача
по лечебной работе

Черных Л.А.

Клинический фармаколог

Невмержицкая В. А.